

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01- _____ é considerado por muitos como o herói fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa corretamente a lacuna.

- A. John Snow.
- B. Rudolf Virchow.
- C. Edwin Chadwick.
- D. Pierre-Charles.
- E. René Villermé.

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que:

- A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão.
- B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas são de natureza inanimada.
- C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na categoria de enfermidades não-infecciosas.
- D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são doenças exclusivamente não-infecciosas.
- E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa.

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas seguintes categorias:

- A. Resistência, suscetibilidade e imunidade.
- B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência.
- C. Infectividade, suscetibilidade e resistência.
- D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade.
- E. Cronicidade, resistência, patogenicidade.

04-“É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos”. Esta é a definição de:

- A. Resistência
- B. Imunidade
- C. Cronicidade
- D. Imunogenicidade
- E. Infectividade

05-A leishmaniose visceral é um tipo de:

- A. Anfixenoses
- B. Antroponoses
- C. Zoonoses
- D. Antropozoonoses
- E. Zooantroponoses

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo de fitonose:

- A. Febre tifóide
- B. Arbovirose silvestre

- C. Arbovirose fitogênica
- D. Leshimaniose visceral
- E. Blastomicose sul-americana

07-A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em:

- A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 e 3.
- B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4.
- C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos sorotipos 1 e 2.
- D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, causada pelos sorotipos 2 e 3.
- E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos sorotipos 1 e 4.

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em:

- A. 1957-1965
- B. 1966-1973
- C. 1968-1977
- D. 1977-1981
- E. 1962-1969

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que servem como meio de transmissão recebem o nome de:

- A. Agressores
- B. Fômites
- C. Invasores
- D. Introdutores
- E. Patogênicos

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar:

- A. Foi aprovada em 1923.
- B. É considerada marco inicial da previdência social no Brasil.
- C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser organizadas por empresas.
- D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, medicamentos por preços baixos, aposentadoria, pensão para herdeiros em caso de morte.
- E. Na década de 60 criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, EXCETO:

- A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
- B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

- C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
- D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
- E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso único nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar e processar informações sobre a população visitada. No entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes informações, EXCETO:

- A. Notificações.
- B. Número de gestantes adolescentes cadastradas.
- C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para o pré-natal.
- D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo mortes violentas).
- E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial Básica (SigeB).

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar:

- A. Organização dos serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento.
- B. É uma das diretrizes que orientam a organização do SUS.
- C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados.
- D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.
- E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao sistema através de maior racionalização no uso dos serviços de saúde, a ser alcançada através da organização e articulação regional da oferta e do acesso aos serviços em seus diferentes níveis de complexidade.

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar:

- A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos determinantes sociais no processo saúde e doença.
- B. Se deu na construção do paradigma denominado medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir das noções de determinação social do processo saúde-doença.
- C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único de Saúde, que visava assegurar, através de seus princípios, os direitos sociais.

- D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por desembocar na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu relatório final assegurando a saúde como direito de todos e dever do Estado fosse incorporada pela constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.
- E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde então, a saúde teve vários avanços.

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO:

- A. Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- B. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
- C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.
- E. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-Na ficha de atendimento ambulatorial (FAA), devem ser preenchidos os dados básicos da produtividade ambulatorial, em campos contendo informações como, exceto:

- A. Unidade prestadora da assistência.
- B. Identificação do usuário.
- C. Descrição do atendimento.
- D. Código dos procedimentos do SIAB/SUS.
- E. Motivo, descrição e diagnóstico/CID.

17-Cinzéis são utilizados principalmente para planificar e clivar o esmalte, podendo se apresentar em diferentes fórmulas e angulações. O que tem o intermediário e a lâmina ligeiramente curvos e é um dos mais versáteis dos instrumentos manuais de corte, servindo para diferentes propósitos é denominado:

- A. Cinzéis retos.
- B. Cinzéis monoangulados.
- C. Cinzéis biangulados.
- D. Cinzéis triangulados.
- E. Cinzéis Wedelstaed.

18-Enxadas são muito semelhantes aos cinzéis diferenciando-se destes por apresentar ângulo da lâmina até próximo de 250 centesimais. Quando a angulação da lâmina for menor que _____ centesimais, o instrumento pode ser considerado como cinzel.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

- A. 10,80
- B. 11,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

- C. 12,50
- D. 13,40
- E. 14,50

19-De acordo com Mondelli, independente de qual a técnica utilizada para afiação de Instrumentos Cortantes Manuais, alguns princípios básicos devem ser observados, dos quais NÃO se inclui:

- A. Estabelecer bisel adequado antes de iniciar a afiação e manter o instrumento fixo, em posição correta, durante todo o procedimento.
- B. Manter a pedra lubrificada com uma fina camada de óleo pouco fluido.
- C. Usar pouca pressão contra a pedra para evitar o desenvolvimento de calor por atrito.
- D. Usar, sempre que possível, uma guia para orientar o plano de desgaste do instrumento.
- E. Conservar as pedras de afiar limpas e livres de equírolas de metal.

20-O período e as concentrações em que os carboidratos permanecem na boca após uma refeição são de grande importância.

As guloseimas como goma de mascar, bombons, chocolates, caramelos, toffees, pastilhas de hortelã e biscoitos doces, que têm altas concentrações de sacarose, o tempo de desaparecimento dessas substâncias da cavidade bucal pode se prolongar por aproximadamente:

- A. 5 minutos.
- B. 10 minutos.
- C. 40 minutos.
- D. 60 minutos.
- E. 120 minutos.

21-Indique o procedimento correto para se realizar uma limpeza no ambiente odontológico.

- A. Limpar as paredes de baixo para cima, em sentido único.
- B. Esfregar as paredes com água e sabão, não utilizando esponja ou pano.
- C. Enxaguar com pano umedecido em um balde com água limpa.
- D. Limpar os pisos da porta para o fundo.
- E. Secar com um pano úmido envolto no rodo.

22-Referente ao risco de infecção, são objetos e instrumentos considerados críticos em ambientes odontológicos, EXCETO:

- A. Ampolas de vidro
- B. Brocas
- C. Limas endodônticas
- D. Pontas diamantadas
- E. Moldeiras

23-Na Técnica de Bass deve-se inicialmente colocar a escova de que forma?

- A. Em ângulo de 45 graus com o eixo longitudinal do dente.
- B. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 45 graus com o plano oclusal.
- C. Em ângulo de 45 graus com o eixo vertical do dente.
- D. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 65 graus com o plano oclusal.
- E. Em ângulo de 65 graus com o eixo longitudinal do dente.



24-

A figura demonstra:

- A. Fratura de dentina, apenas.
- B. Fratura de esmalte, apenas.
- C. Fratura de esmalte e dentina.
- D. Fratura de dentina e polpa.
- E. Fratura de esmalte, dentina e polpa.

25-Sobre o Tabagismo é INCORRETO afirmar:

- A. As substâncias relacionadas ao cigarro (nicotina, monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio) podem agir como vasodilatadores, o que resulta em isquemia do tecido, redução da resposta inflamatória e do reparo celular.
- B. O progresso da doença periodontal é duas vezes mais rápido em fumantes do que em não-fumantes.
- C. O fumo intenso de cigarros pode levar ao escurecimento da gengiva onde o ar aquecido é aspirado, na maioria das vezes na gengiva vestibular anterior.
- D. Fumo intenso também pode levar à leucoplasia.
- E. O ato de fumar irá afetar o resultado do tratamento após a raspagem, o alisamento radicular, cirurgia de retalho e terapia periodontal regenerativa.


26-No cálculo das porcentagens de faces com placa, o índice aceitável é de:

- A. 30%.
- B. 35%.
- C. 40%.
- D. 45%.
- E. 50%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

27-Os principais fatores de risco do câncer de boca são, EXCETO:

- A. O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco de aparecimento do câncer de boca.
- B. Exposição à radiação solar.
- C. Má higiene bucal.
- D. Uso de próteses dentárias mal-ajustadas.
- E. Deficiência nutricionais (adquiridas ou congênitas).



28- Indique a sequência correta:

- A. 1 - Dentina, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 - coroa, 6 - polpa.
- B. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - polpa, 4 - dentina, 5 - esmalte, 6 - raiz.
- C. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 - dentina, 6 - polpa.
- D. 1 - Coroa, 2 - polpa, 3 - raiz, 4 - dentina, 5 - esmalte, 6 - gengiva.
- E. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - polpa, 5 - esmalte, 6 - dentina.

29-Quanto ao avental não cirúrgico e calça é INCORRETO afirmar:

- A. O avental não cirúrgico e a calça, elementos do uniforme para procedimentos semi-críticos, devem ter obrigatoriamente a cor branca.
- B. Após o dia de trabalho este uniforme deve ser descartado em saco plástico para roupa suja.
- C. O profissional deve lembrar que a calça e o avental não estéril são de uso exclusivo do consultório e não devem ser usados fora deste local.
- D. O avental não cirúrgico, de preferência, deve ter gola alta do tipo “gola de padre”, com mangas longas e comprimento de $\frac{3}{4}$ com punhos em elásticos.
- E. Ele pode ser confeccionado em algodão ou polipropileno.

30-Os dentes caninos tem em média o comprimento de:

- A. 12 a 15mm.
- B. 14 a 17mm.
- C. 14 a 20mm.
- D. 24 a 27mm.
- E. 12 a 24mm.

31-São características do Peróxido de Hidrogênio, EXCETO:

- A. Conhecido como Água Oxigenada.
- B. Exerce poder anti-séptico.
- C. Tem o objetivo de eliminar restos sanguíneos pulpares.
- D. É mais utilizado para auxiliar no preparo de canal radicular.
- E. Favorece a hemostasia.

32-O isolamento absoluto é um método simples e rápido de ser aplicado; eficaz no isolamento de um dente até em casos de maior dificuldade.

Quando adequadamente colocado, o seu uso proporciona, EXCETO:

- A. Prevenção de contaminação do campo cirúrgico por saliva, sangue ou outros fluidos tissulares.
- B. Manutenção da cadeia de assepsia em quase todas as fases do tratamento.
- C. Permite um campo operatório seco, limpo e passível de desinfecção.
- D. Reduz significativamente a possibilidade de infecção cruzada.
- E. Protege o paciente contra a aspiração ou deglutição de detritos, fragmentos de dente ou de restaurações, de instrumentos endodônticos ou brocas, fármacos ou substâncias químicas auxiliares de alto poder irritante utilizadas localmente durante o tratamento.

33-Sobre os Grampos endodônticos é INCORRETO afirmar:

- A. Funcionam mantendo o lençol de borracha em posição estável junto aos dentes.
- B. Existem no comércio vários tipos de grampos endodônticos destinados ao uso em grupos dentais específicos.
- C. Devem ser escolhidos de acordo com a anatomia do colo anatômico do dente no qual serão colocados.
- D. Estes grampos podem ser com ou sem asas ou aletas.
- E. A numeração dos grampos é universal, não podendo ser atribuídas pelos fabricantes de maneira própria.

34-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser seguidas as recomendações do fabricante com respeito à concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes procedimentos também devem ser observados sobre os quais é INCORRETO afirmar:

- A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário, de acordo com as instruções do fabricante.
- B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de processamento com prazo de validade expirado.
- C. Deve ser realizada uma inspeção visual simples do filme durante os processamentos manuais.
- D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser mantidas limpas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

- E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido do calor, umidade, radiação e vapores químicos.

35-O instrumental esterilizado deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armários fechados, protegido de poeira, umidade e insetos, e a uma distância mínima de:

- A. 50 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede.
- B. 20 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede.
- C. 30 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede.
- D. 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede.
- E. 50 cm do chão, 30 cm do teto e 5 cm da parede.

36-São recomendações básicas de higiene dentária que devem ser feitas ao paciente no seu Pós-Operatório, EXCETO:

- A. Manter a higiene oral de costume, com o uso de escova e fio dental.
- B. Não realizar bochechos.
- C. Não ingerir alimentos sólidos ou quentes; dar preferência a alimentos frios ou a temperatura ambiente, com consistência líquida ou pastosa, pelo menos nas primeiras 48 horas pós-cirúrgicas.
- D. Fazer uso de gelo extra bucal (bolsa de gelo) no período pós-extração (durante as primeiras 48 horas).
- E. Fazer repouso relativo nas primeiras 24 horas.

37-Sobre as manifestações bucais pelo HIV é INCORRETO afirmar:

- A. As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença.
- B. As lesões bucais, quando detectadas, podem ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que podem aumentar a sobrevivência dos usuários.
- C. Deve-se observar, em especial: a candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, que são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário.
- D. O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e este deve receber informações sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento. Estas indicações devem ser feitas por toda a equipe de saúde, em comum acordo com o usuário.
- E. Portadores do Vírus HIV apresentam risco elevado para o aparecimento de doença periodontal de evolução lenta e geralmente há uma boa resposta ao tratamento de rotina (raspagens e polimentos). Enxágüe com solução antibacteriana (cetoconazol) pode reduzir o risco de complicações sistêmicas se realizado antes e após estes procedimentos.

38-A candidíase é a infecção fúngica mais comum que acomete a cavidade bucal. Qual é a espécie mais frequentemente isolada e associada com doença?

- A. Candida krusei.
- B. Candida parakrusei.
- C. Candida lusitanae.
- D. Candida albicans.
- E. Candida tropicalis.

39-Sobre higiene bucal em crianças é INCORRETO afirmar:

- A. A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental. Usa-se um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva.
- B. A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro dente decíduo, não é necessário uso de dentífrico devido à possibilidade de ingestão pelo bebê.
- C. A partir da erupção dos primeiros molares decíduos pode-se usar o mínimo possível de dentífrico (quantidade equivalente a um grão de feijão cru).
- D. Um cuidado particularmente importante é a frequência do uso do creme dental, pois acontece ingestão do mesmo nessa idade, podendo causar fluorose.
- E. O dentífrico deve ser mantido fora do alcance das crianças.

40-O vírus da Hepatite viral do tipo B (HBV), em temperatura ambiente, pode sobreviver em superfícies por períodos de até:

- A. 12 horas.
- B. 24 horas.
- C. 48 horas.
- D. Uma semana.
- E. Duas semanas.